

# 松くい虫防除の薬剤散布にご理解とご協力を

松は、防風、防潮、飛砂防止、土砂流出、崩壊防止、水源かん養等、公益的機能の保持や、美しい景観作りなど多くの役割を果たしています。

これらの貴重な「松」を松くい虫被害から守るために防除事業を下記のとおり実施しますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。

## 1. 散布期日及び区域（裏面を参照してください。）

防除方法	第1回散布期日	第2回散布期日	散布区域	ヘリポート
空中散布 (ヘリコプター)	6月2日(火)	6月17日(水)	・北栄町西園～江北海岸部	天神川河川敷
地上散布 (高圧動力噴霧機)	6月3日(水)	6月18日(木)	・北栄町由良宿～西園 ・松神～下神海岸 (風車隣接松林10m幅、2km)	

(注) この日程は気象状況(雨・風等)により変更されることがあります。

中止の場合は、後日実施します。日程については、町放送でお知らせします。

## 2. 散布実施時間

空中散布…午前5時頃～午前7時頃まで

地上散布…午前5時頃～午後3時頃まで

※気象条件により多少時間がずれる場合があります。

## 3. 使用する農薬

(ha当たり)

散布薬剤名			散布方法	散布松林の区分
薬剤名	濃度	散布量		
エコワン3フロアブル	20倍液	30㍓	空中散布(ヘリコプター)	群集松林
(チアクプロリト <sup>®</sup> 3.0%含有)	200倍液	600㍓	地上散布(高圧噴霧機)	空中散布困難な松林

## 4. 事故防止のためのお願い

(1) 散布当日は、散布区域内及びその付近の山林に入ると人によっては、「頭痛やめまい」等が起きることがありますので、その場合は速やかに水洗い等を行って最寄りの病院へご相談ください。なお、散布後1週間程度は散布区域とその付近には立ち入らないようにしてください。

(2) ヘリコプターの発着場所(ヘリポート)は危険ですから近寄らないようにしてください。

(3) 散布中は、区域内での駐車は避けてください。なお、使用薬剤がかかったと思われる場合は速やかに洗車してください。

(4) 付近で栽培されている農作物については、万一の薬害防止のため、ラッキョウ(種ラッキョウは除く)についてはビニールシート被覆、葉たばこ等は散布中にできるだけかん水していただきますようご協力ください。

(5) 散布区域付近の住宅は、散布時には窓を閉めるとともに、洗濯物、飲食物等を外に出さないようにしてください。

(散布についての問い合わせ先)

北栄町産業振興課


電話 37-3152

(松くい虫防除空中散布に対するご意見、ご相談の連絡先)

鳥取県中部県民福祉局

電話 23-3983

# 令和8年度北栄町松くい虫防除薬剤散布実施区域



空中散布	第1回目	第2回目
	6月2日	6月17日

地上散布	第1回目	第2回目
	6月3日	6月18日

ヘリポート田後作業基地

凡 例	
空中散布	
地上散布	
作業基地(ヘリポート)	
樹幹注入(国有林)	